

**Pesquisa nacional sobre cobertura vacinal,
seus múltiplos determinantes e as ações de imunização nos
territórios municipais brasileiros**

**Principais Resultados
GOIÁS**

Pesquisa nacional sobre cobertura vacinal, seus múltiplos determinantes e as ações de imunização nos territórios municipais brasileiros

- ❖ **Desenvolvida pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (NESCON/FM/UFMG), sob demanda do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)**

- ❖ **Período de execução: março a dezembro de 2021**

COORDENAÇÃO DA PESQUISA:

Francisco Eduardo de Campos (Prof. FM/UFMG e Especialista FIOCRUZ)

Palmira de Fátima Bonolo (Profa. DMPS/FM/UFMG)

Sabado Nicolau Girardi (Coordenador EPSM/NESCON/FM/UFMG)

EQUIPE CONASEMS: Kandice Falcão, Rosângela Treichel, Alessandro Chagas e Flávio Álvares

EQUIPE NESCON/FM/UFMG:

Alice Werneck Massote (EPSM/NESCON)

Ana Cristina de Sousa van Stralen (EPSM/NESCON)

Ana Carolina M. de Assis Chagas (EPSM/NESCON)

Camilo de Oliveira Aggio (DCS/FAFICH/UFMG)

Carla Luiza de Oliveira (Margem/UFMG)

Carla Rodrigues (INCT.DD)

Cecília Nogueira Rezende (EPSM/NESCON)

Daisy Maria Xavier de Abreu (NESCON)

Dilvan Passos de Azevedo (INCT.DD)

Érica Araújo Silva Lopes (NESCON)

Erick de Oliveira Faria (EPSM/NESCON)

Fabiana Guerra Pimenta (EPSM/NESCON)

Fernando Antônio Camargo Vaz (EPSM/NESCON)

Filipe Mendes Motta (Margem/UFMG)

Gabriela Wenzel (INCT.DD)

Gilvânia Westin Cosenza (NESCON)

Hugo André da Rocha (NESCON)

Jackson Freire Araujo (EPSM/NESCON)

Jeferson Canesso (EPSM/NESCON)

Joana Natália Cella (EPSM/NESCON)

João Batista Girardi Junior (EPSM/NESCON)

João Guilherme Bastos dos Santos (INCT.DD)

Larissa Mary de Carvalho (EPSM/NESCON)

Lucas Pereira Wan Der Maas (EPSM/NESCON)

Renato Duarte Caetano (Margem/UFMG)

Ricardo Fabrino Mendonça (DCP/FAFICH/UFMG)

Samuel Araujo Gomes da Silva (EPSM/NESCON)

Ulysses Panisset (DMPS/FM/UFMG)

Analisar a situação atual da cobertura vacinal e identificar os principais desafios à efetividade da política e das ações de imunização nos territórios municipais em nível nacional, investigando a queda da cobertura vacinal e seus determinantes, com ênfase na hesitação vacinal e desinformação

- Declínio na cobertura vacinal no Brasil desde 2016, acarretando o reaparecimento de algumas doenças imunopreveníveis
- Comprometimento da homogeneidade das coberturas vacinais (obtenção da meta de cobertura vacinal em 75% dos municípios)
- Fenômeno da hesitação vacinal (atraso em aceitar ou recusa às vacinas recomendadas) que ocorre mundialmente e que vem se tornando mais presente no Brasil
- Impacto da pandemia da COVID-19 no enfraquecimento dos programas de imunização

Literatura indica alguns fatores que podem estar relacionados a esse declínio:

- Enfraquecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (DONIEC; DALL'ALBA; KING, 2018; RASELLA et al., 2018)
- Mudanças recentes nos sistemas de informação do PNI (SILVA et al., 2020)
- Baixa percepção de risco para doenças que não são mais comuns atualmente (SATO, 2018)
- Desconhecimento dos esquemas vacinais preconizados nos calendários (BRASIL, 2018)
- Questões estruturais: Horário de funcionamento das salas de vacina, desabastecimento de insumos, número insuficiente de profissionais de saúde capacitados, dificuldades na alimentação do sistema de informação do PNI (BRASIL, 2018)
- Movimento antivacina (APS et al., 2018)

- **O que mudou a partir do ano de 2016 e que contribuiu para a queda da cobertura vacinal no Brasil?**
- **Quais fatores estão associados à queda nos índices vacinais?**
- **Quais componentes da hesitação vacinal podem estar relacionados à queda das coberturas vacinais?**
- **Quais são as maiores dificuldades e desafios para a realização das ações de imunização nos territórios municipais considerando os fatores associados à queda da cobertura vacinal e aos componentes da hesitação vacinal e da desinformação?**
- **Quais são as sugestões/recomendações para o enfrentamento dos problemas apontados?**

Pesquisa quali-quantitativa, organizada em 4 componentes

COMPONENTE	METODOLOGIAS	FONTE/ATOR/PÚBLICOS-ALVO	TIPO
1 - Contextualização	Revisão de literatura	Artigos científicos e literatura cinzenta	Preparação
	Estudo descritivo retrospectivo da cobertura vacinal	DATASUS	Quantitativa
	Mapeamento de atores, percepções e atitudes sobre vacinação	Postagens em mídias digitais (Twitter, Youtube, Telegram, Instagram, Facebook)	Qualitativa
2 - Coleta de dados com atores envolvidos nas ações de imunização	Survey online	Secretarias Municipais de Saúde (Secretários de Saúde e Responsáveis pelas ações de Imunização nos municípios)	Quantitativa
	Grupos focais online	Gestores municipais; apoiadores COSEMS/CONASEMS; profissionais de saúde; e população adulta	Qualitativa
	Entrevistas em profundidade interpessoais online	Gestores federais, Coordenadores Estaduais de Imunização e especialistas na área	Qualitativa
3 - Survey de hesitação vacinal	Survey por Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador (ETAC)	Usuários, Profissionais de Saúde	Quantitativa
4 - Pesquisa de opinião deliberativa (Diálogos Online)	Fóruns	Gestores municipais de saúde, profissionais de saúde e usuários	Quali-quantitativa
	Grupos de Diálogos online (GDol) / rodas de conversa	Gestores municipais de saúde e profissionais de saúde	Qualitativa
	Webinários e Conferências	Público geral	Divulgação

Resultados

Retrospectiva Cobertura Vacinal 2010/2020

Estudo descritivo retrospectivo sobre cobertura vacinal no Brasil, analisando os registros realizados no período entre 2010 a 2021.

Foram consideradas as 11 vacinas que compõem o calendário básico de imunização de crianças até os 15 meses de vida.

A análise foi realizada a partir dos dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)/DATASUS.

Indicadores utilizados:

- **Índice de Cobertura Vacinal (ICV)**
- **Homogeneidade das CV**
- **Taxa de Abandono (TA)**

Índice de Cobertura Vacinal de crianças até 15 meses, por imunobiológico BRASIL

Imunobiológicos (calendário infantil)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	106,7	107,9	105,7	107,4	107,3	105,1	95,6	98,0	99,7	86,7	73,3	70,7
Hepatite B					88,5	90,9	81,8	85,9	88,4	78,6	62,8	62,2
Rotavírus Humano	83,0	87,1	86,4	93,5	93,4	95,4	89,0	85,1	91,3	85,4	77,0	70,5
Pentavalente			24,9	95,9	94,8	96,3	89,3	84,2	88,5	70,8	76,9	70,5
Pneumocócica	24,0	81,7	88,4	93,6	93,5	94,2	94,9	92,2	95,3	89,1	81,0	73,5
Poliomielite	99,4	101,3	96,6	100,7	96,8	98,3	84,4	84,7	89,5	84,2	75,9	70,0
Meningococo C	26,9	105,7	96,2	99,7	96,4	98,2	91,7	87,4	88,5	87,4	78,2	71,0
Febre Amarela	86,1	89,5	90,2	94,0	86,0	83,5	80,7	77,5	80,7	77,4	57,1	57,7
Tríplice Viral (SRC-D1)	99,9	102,4	99,5	107,5	112,8	96,1	95,4	86,2	92,6	93,1	79,5	73,5
Tetra Viral (SRC+VZ)				34,2	90,2	77,4	79,0	35,4	33,3	34,2	20,7	5,7
Hepatite A					60,1	97,1	71,6	78,9	82,7	85,0	74,9	66,9

Legenda

Muito baixo < 50%

Baixo ≥ 50% a < meta

Adequado ≥ meta a ≤ 120%

Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.

Índice de Cobertura Vacinal de crianças até 15 meses, por imunobiológico REGIÃO CENTRO OESTE

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	110,6	110,2	109,0	116,9	116,9	105,4	104,1	97,5	102,2	93,8	78,6	76,5
Hepatite B					98,4	95,4	90,9	86,4	97,6	90,6	70,2	69,7
Rotavírus Humano	87,0	88,9	89,6	101,0	101,6	95,3	97,9	85,7	90,7	86,7	81,1	75,0
Pentavalente			33,0	103,8	101,6	95,2	100,0	83,8	87,5	71,1	79,6	73,7
Pneumocócica	21,6	87,4	91,5	101,6	101,4	92,8	104,6	91,1	94,9	90,1	85,9	78,4
Poliomielite	99,1	100,0	99,4	109,0	104,1	97,9	96,2	84,4	88,6	85,4	79,8	73,6
Meningococo C	10,1	115,1	98,9	107,1	104,4	97,4	103,2	86,9	89,5	88,9	83,0	75,4
Febre Amarela	78,9	82,9	80,9	100,3	99,6	87,2	94,0	78,7	83,0	77,9	68,7	66,8
Tríplice Viral (SRC-D1)	100,7	103,1	101,6	112,4	122,5	93,7	99,5	83,4	91,0	91,3	78,6	78,6
Tetra Viral (SRC+VZ)				35,0	93,6	68,2	95,3	63,1	67,4	77,5	53,2	5,6
Hepatite A					70,7	93,6	82,0	80,1	84,4	85,9	79,2	70,1

Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.

Legenda
Muito baixo < 50%
Baixo ≥ 50% a < meta
Adequado ≥ meta a ≤ 120%

Índice de Cobertura Vacinal de crianças até 15 meses, por imunobiológico GOIÁS

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	118,3	120,2	112,8	116,4	115,5	105,3	92,3	88,7	93,6	86,7	78,1	73,0
Hepatite B					78,4	82,6	68,6	71,0	79,1	77,5	67,6	65,6
Rotavírus Humano	86,5	92,5	90,4	102,5	96,3	97,0	87,8	83,8	88,4	84,0	80,2	74,1
Pentavalente			40,9	105,6	93,9	94,9	84,9	78,6	83,8	64,0	76,3	72,7
Pneumocócica	19,1	99,8	95,9	101,4	93,1	89,9	91,8	88,2	91,8	87,0	84,4	77,3
Poliomielite	100,6	107,1	101,0	107,7	97,7	95,9	82,1	81,6	85,5	81,5	77,9	72,3
Meningococo C	9,7	123,6	101,4	106,2	97,7	96,7	87,7	84,8	87,6	85,7	81,8	74,5
Febre Amarela	102,3	108,0	102,6	103,6	91,7	84,8	79,5	74,0	78,7	73,4	66,2	65,8
Tríplice Viral (SRC-D1)	106,8	115,5	107,7	117,8	122,1	94,8	85,9	81,0	87,8	88,4	75,5	77,8
Tetra Viral (SRC+VZ)				32,5	86,0	63,2	85,2	59,6	59,5	71,2	52,6	7,3
Hepatite A					69,2	90,7	72,3	77,5	81,6	83,3	79,1	70,1

Legenda
Muito baixo < 50%
Baixo ≥ 50% a < meta
Adequado ≥ meta a ≤ 120%

Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.

ICV crianças até 15 meses

MACRORREGIÃO CENTRO SUDESTE

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	126,6	128,2	105,7	112,3	113,0	102,0	98,2	87,2	86,1	86,6	72,9	64,9
Hepatite B					83,2	81,1	77,2	72,8	79,9	80,8	66,4	58,8
Rotavírus Humano	83,8	100,8	91,5	113,9	91,9	100,5	93,7	81,9	86,0	87,6	78,7	62,3
Pentavalente			42,7	108,7	94,1	99,8	90,5	75,5	82,2	67,4	76,9	61,5
Pneumocócica	17,7	111,5	100,0	101,8	91,1	93,7	96,3	84,0	88,6	90,4	82,7	64,6
Poliomielite	101,4	113,1	108,4	109,2	99,7	99,5	91,1	77,8	83,2	83,9	76,5	61,0
Meningococo C	5,2	124,1	102,1	105,0	94,9	101,7	93,5	80,5	85,6	88,6	79,6	62,9
Febre Amarela	105,2	120,3	105,5	106,0	92,2	86,2	89,8	74,2	76,2	75,1	66,8	55,0
Tríplice Viral	113,3	134,3	104,9	119,6	128,7	99,0	92,8	78,3	84,2	90,9	76,0	66,1
Tetra Viral (SRC+VZ)				29,5	87,4	78,6	92,7	55,6	51,3	74,4	51,7	6,1
Hepatite A					67,5	95,4	83,8	73,9	77,2	86,2	76,7	58,7

MACRORREGIÃO CENTRO NORTE

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	111,3	117,9	106,0	115,0	111,1	106,7	99,0	97,8	97,4	94,0	74,8	74,5
Hepatite B					91,8	96,3	83,3	88,0	89,4	87,5	61,3	62,9
Rotavírus Humano	86,5	90,3	89,9	102,9	99,0	96,3	92,7	89,6	89,5	86,2	80,4	74,6
Pentavalente			37,3	109,2	97,2	93,8	89,3	85,2	84,2	65,1	79,1	73,2
Pneumocócica	16,4	101,1	94,1	103,9	91,9	86,4	97,4	93,6	92,7	90,5	83,3	78,0
Poliomielite	95,0	110,9	97,7	120,3	98,0	93,2	82,7	88,2	86,3	83,5	78,5	71,5
Meningococo C	5,0	123,6	96,7	110,3	100,5	95,6	93,2	91,2	89,5	87,6	82,4	75,3
Febre Amarela	100,1	103,7	94,0	111,4	91,6	80,2	82,2	76,8	79,4	74,7	68,0	65,6
Tríplice Viral	104,2	107,6	101,7	127,8	116,8	93,9	90,6	86,3	89,5	89,1	78,6	77,6
Tetra Viral (SRC+VZ)				40,7	78,4	47,5	91,0	64,8	66,3	72,5	51,8	8,2
Hepatite A					64,4	90,5	75,2	83,3	84,7	85,9	80,0	70,9

Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.

Legenda
Muito baixo < 50%
Baixo ≥ 50% a < meta
Adequado ≥ meta a ≤ 120%

ICV crianças até 15 meses

MACRORREGIÃO CENTRO OESTE

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	114,4	109,5	113,2	114,2	114,5	107,0	91,8	83,5	97,9	84,1	80,7	85,4
Hepatite B					88,7	95,7	72,4	75,5	92,3	85,8	74,3	80,5
Rotavírus Humano	88,8	90,5	94,0	99,5	101,2	98,3	86,8	81,9	89,2	78,4	78,4	78,3
Pentavalente			43,1	100,9	90,6	87,2	81,9	76,9	83,7	61,6	75,1	75,8
Pneumocócica	23,3	95,5	92,6	98,9	94,9	91,4	89,4	86,0	92,9	80,8	82,9	81,9
Poliomielite	97,3	97,4	97,0	101,2	91,9	89,0	80,4	79,4	85,3	75,3	76,2	75,9
Meningococo C	17,3	124,8	100,4	103,7	98,3	95,1	84,7	81,9	85,4	79,5	79,4	78,7
Febre Amarela	92,6	96,1	95,0	94,2	87,2	84,9	74,5	74,3	78,9	68,8	64,0	72,3
Tríplice Viral	95,9	101,3	100,8	105,7	112,2	92,7	81,6	78,5	88,0	81,9	69,2	81,6
Tetra Viral (SRC+VZ)				34,0	92,5	69,8	80,8	57,3	61,1	67,8	50,7	7,4
Hepatite A					80,0	89,1	65,9	76,1	82,1	76,2	78,8	75,4

MUNICÍPIO GOIÂNIA

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	118,5	104,0	110,0	113,0	117,2	110,2	90,0	77,7	98,5	78,3	81,1	93,6
Hepatite B					91,7	103,6	73,9	71,8	92,6	83,4	79,1	94,8
Rotavírus Humano	88,5	89,3	95,8	96,8	102,0	99,7	83,6	76,1	84,3	68,4	74,8	76,7
Pentavalente			44,7	94,5	87,8	83,5	77,5	72,8	81,1	56,1	74,9	72,6
Pneumocócica	27,0	93,3	91,3	95,4	96,2	91,5	84,8	78,8	88,2	70,5	78,9	79,9
Poliomielite	95,6	89,7	94,2	94,6	92,4	85,1	76,2	73,6	81,1	64,8	71,9	72,6
Meningococo C	22,2	123,6	99,9	98,2	98,6	93,6	80,2	76,0	78,7	69,2	75,2	76,8
Febre Amarela	89,2	89,5	90,6	87,7	85,9	84,4	68,8	69,3	75,2	60,3	59,0	71,7
Tríplice Viral (SRC-D1)	92,1	96,3	97,1	97,0	106,4	90,5	74,4	71,0	83,0	73,2	59,4	76,5
Tetra Viral (SRC+VZ)				35,1	98,7	80,9	75,1	53,2	61,7	62,2	47,1	6,0
Hepatite A					90,6	87,1	60,1	71,1	77,5	66,7	74,0	74,5

Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.

Legenda

Muito baixo < 50%

Baixo ≥ 50% a < meta

Adequado ≥ meta a ≤ 120%

ICV crianças até 15 meses

MACRORREGIÃO NORDESTE

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	122,5	134,1	121,9	118,2	123,9	101,2	81,1	90,6	88,2	81,8	74,8	54,8
Hepatite B					35,7	44,2	34,8	39,3	37,2	44,3	53,5	45,7
Rotavírus Humano	84,6	88,8	83,7	94,9	87,9	87,6	77,7	83,5	87,2	84,0	81,9	78,3
Pentavalente			40,0	103,0	92,1	92,9	79,4	79,6	83,2	58,6	72,3	78,0
Pneumocócica	16,8	94,6	97,1	99,0	90,6	81,6	84,5	90,6	91,1	87,2	87,6	81,5
Poliomielite	108,6	117,0	103,6	105,4	105,5	104,9	74,4	82,7	86,5	84,2	79,9	77,8
Meningococo C	5,7	121,0	105,6	104,1	93,8	90,1	80,7	87,9	90,4	88,2	85,7	78,1
Febre Amarela*	115,4	118,1	115,2	105,7	99,1	85,7	75,8	69,7	79,3	75,4	66,1	65,5
Tríplice Viral	119,4	125,9	123,7	125,7	139,0	91,0	80,2	81,8	88,0	93,5	79,1	82,9
Tetra Viral (SRC+VZ)				26,0	96,5	55,6	78,5	64,0	61,6	70,8	54,2	7,3
Hepatite A					55,6	86,5	65,6	77,8	82,4	86,4	78,7	71,5

MACRORREGIÃO SUDOESTE

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	117,4	114,3	119,8	132,1	114,1	112,2	93,7	91,2	99,2	93,7	92,1	81,4
Hepatite B					98,1	96,6	81,2	88,1	97,2	90,1	85,1	73,4
Rotavírus Humano	88,6	92,7	90,5	103,5	101,6	104,9	91,1	85,6	91,3	91,5	86,2	76,7
Pentavalente			37,4	114,9	103,0	116,4	86,8	78,8	87,6	73,2	82,0	75,2
Pneumocócica	16,6	98,2	98,6	110,6	98,7	98,7	95,7	91,5	94,3	94,5	89,1	80,1
Poliomielite	102,9	100,5	98,8	111,6	96,4	97,8	83,1	83,9	88,3	89,2	82,0	75,0
Meningococo C	8,5	123,2	103,0	115,4	105,4	106,8	90,8	86,8	91,2	92,4	86,1	77,1
Febre Amarela*	105,5	108,3	110,7	114,2	91,3	87,0	78,3	76,0	80,9	79,8	70,0	67,9
Tríplice Viral	108,7	116,2	114,4	123,0	116,7	102,2	90,0	85,2	91,8	94,3	84,3	80,5
Tetra Viral (SRC+VZ)				34,3	51,3	48,5	88,3	58,7	56,7	74,1	59,5	7,7
Hepatite A					71,1	94,6	78,7	79,5	82,3	91,0	84,7	72,3

Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.


Legenda

Muito baixo < 50%

Baixo ≥ 50% a < meta

Adequado ≥ meta a ≤ 120%

Brasil, Região Centro Oeste, Goiás e 5 Macrorregiões




Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

* **crianças com até 15 meses por imunobiológico**

Taxa de Abandono do esquema vacinal básico*: 2015 e 2020

Rotavírus, Pentavalente, Pneumocócica, Poliomielite, Meningocócica C e Tríplice Viral.

Brasil, Região Centro Oeste, Goiás e 5 Macrorregiões



Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

* crianças com até 15 meses por imunobiológico

Taxa de abandono
 Baixa < 5%
 Média ≥ 5% a < 10%
 Alta ≥ 10%

Taxa de Homogeneidade das Coberturas Vacinais 2010-2020

% de municípios que atingiu a meta de cobertura vacinal preconizada pelo PNI GOIÁS

Imunobiológicos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BCG	68,7	70,3	68,3	74,0	70,3	63,4	55,3	59,8	66,7	54,1	32,9
Febre Amarela	54,1	65,9	58,9	68,3	37,4	33,3	27,6	25,2	27,6	22,8	19,5
Hepatite A	-	-	-	-	12,2	56,1	28,9	31,7	41,5	41,9	41,5
Hepatite B em crianças até 30 dias	-	-	-	-	36,6	36,6	25,6	34,6	41,1	29,7	12,6
Meningococo C	-	90,2	65,0	79,7	56,1	66,3	54,9	53,3	51,2	48,0	41,5
Pentavalente	-	-	0,8	78,1	50,4	61,0	46,3	43,9	40,7	17,5	41,5
Pneumocócica	-	68,7	63,0	78,5	48,0	52,0	61,8	58,1	59,8	52,4	48,0
Poliomielite	69,1	76,0	61,4	78,1	48,8	54,9	43,1	45,1	44,7	38,6	39,4
Rotavírus Humano (VORH)	62,2	64,6	60,2	79,7	64,6	69,9	61,8	58,5	64,2	56,5	47,2
Tetra Viral (SRC+VZ)	-	-	-	3,3	30,1	5,3	52,9	15,5	14,6	25,2	11,0
Tríplice Viral (SRC-D1)	76,4	74,4	70,3	90,2	78,9	59,8	54,5	45,5	50,8	51,6	37,8


Fonte: NESCON/FM/UFMG a partir dos dados do SI-PNI/DATASUS.

Metas preconizadas: 90% para BCG e Rotavírus, 100% para Febre Amarela e 95% para as demais.

Legenda
Muito baixo < 50%
Baixa ≥ 50% a < 70 meta
Adequada (≥ meta 70)

% municípios que atingiram a meta de 80% de salas de vacina alimentando mensalmente o SI-PNI 2013 a 2019.


Brasil, Região Centro Oeste, Goiás e 5 Macrorregiões



Resultados

Survey online
Secretarias Municipais de Saúde

% de municípios respondentes por estado



	Nº munic.	Nº respondentes	%
Norte	450	438	97,3
AC	22	22	100,0
AM	62	62	100,0
AP	16	16	100,0
PA	144	136	94,4
RO	52	52	100,0
RR	15	15	100,0
TO	139	135	97,1
Nordeste	1.794	1.674	93,3
AL	102	102	100,0
BA	417	387	92,8
CE	184	160	87,0
MA	217	160	73,7
PB	223	223	100,0
PE	185	180	97,3
PI	224	222	99,1
RN	167	165	98,8
SE	75	75	100,0
Sudeste	1.668	1.268	76,0
ES	78	77	98,7
MG	853	555	65,1
RJ	92	92	100,0
SP	645	544	84,3
Sul	1.191	905	76,0
PR	399	353	88,5
RS	497	302	60,8
SC	295	250	84,7
Centro-Oeste	467	405	86,7
DF	1	1	100,0
GO	246	202	82,1
MS	79	75	94,9
MT	141	127	90,1
Brasil	5.570	4.690	84,2


Caracterização dos respondentes

- 79% dos respondentes de Goiás eram do sexo feminino, proporção que é semelhante à do Brasil (78%) e da Região Centro Oeste (77%).
- Cerca de 90% possuem curso superior (Goiás, Brasil e Centro Oeste) sendo a maioria em Enfermagem. Aqueles com pós-graduação representavam 53,5% dos respondentes.
- 35% dos respondentes em Goiás ocupavam o cargo de secretário municipal de saúde. Brasil 34% e Centro Oeste 33%
- 36% eram Coordenadores de Vigilância em Saúde. Brasil 15% e Centro Oeste 26%
- 19% ocupavam o cargo de coordenador/responsável pela imunização, Brasil (39%) e Centro Oeste (29%).


Estruturação das ações de imunização nos municípios

- Em Goiás a Vigilância em saúde/epidemiológica foi a principal área responsável pelas ações de imunização nos municípios (72%), superando os percentuais do Centro Oeste e Brasil (ambos 54%).
- Em cerca de 69% dos municípios de Goiás havia um cargo específico de coordenação, gerência ou gestão das ações de imunização no município, similar ao verificado no Brasil (68%) e Centro Oeste (66%).
- Em Goiás a aplicação de vacinas ocorria predominantemente de forma centralizada em uma UBS ou Central de Imunização (53%), superando o percentual alcançado em nível nacional (37%) e do Centro Oeste (45%).
- 28% dos municípios de Goiás descentralizam a aplicação de vacinas em todas as UBS


Distribuição (%) dos respondentes em relação a problemas no recebimento de vacinas




Problemas frequentes* no recebimento de vacinas



Distribuição (%) dos respondentes em relação a problemas de armazenamento de vacinas




Problemas frequentes* no armazenamento de vacinas




Armazenamento de vacinas: perda de doses

	Brasil	Centro Oeste	Goiás	Macro Centro Sudeste	Macro Centro-Norte	Macro Centro-Oeste	Macro Nordeste	Macro Sudoeste
Perda de doses	53,7	51,1	48,5	51,2	52,8	47,1	56,7	29,6


Principais causas para a perda de doses*



Distribuição (%) dos respondentes em relação a problemas na aplicação de vacinas



Problemas frequentes* na aplicação de vacinas



% dos respondentes em relação à oferta de ações de capacitação para atividades de vacinação


	Brasil	Centro Oeste	Goiás	Macro Centro Sudeste	Macro Centro-Norte	Macro Centro-Oeste	Macro Nordeste	Macro Sudoeste
Ofertadas pelo município	54,6	45,7	49,5	43,9	52,8	51,0	43,3	55,6
Ofertadas pelo Estado	52,1	55,1	61,9	63,4	66,0	56,9	66,7	55,6

Frequência das ações de capacitação: Mais de 50 % dos municípios informaram que não há frequência definida para as ações de capacitação dos profissionais de sala de vacina


Busca ativa dos faltosos

- Em Goiás, 95% dos municípios realiza busca ativa para vacinação de faltosos, especialmente das crianças.
- Os ACS participam das ações de vacinação: busca ativa, verificação do cartão de vacina e participação em ações de mobilização para vacinação.


Distribuição (%) dos respondentes em relação a problemas de atraso ou recusa da população em receber a vacinação



Motivos identificados como frequentes para o atraso/recusa na vacinação




Motivos identificados como frequentes para o atraso/recusa na vacinação (continuação...)




Questões relacionadas ao atraso/recusa

% dos respondentes que consideram que houve aumento no atraso ou recusa da população em se vacinar nos últimos 5 anos

Brasil	Centro-Oeste	Goiás	Macro Centro Sudeste	Macro Centro-Norte	Macro Centro-Oeste	Macro Nordeste	Macro Sudoeste
41,6	44,9	45,5	56,1	41,5	45,1	40,0	44,4




Distribuição (%) dos respondentes em relação a problemas de registro de vacinas




■ Muita Frequência ■ Pouca Frequência ■ Não apresenta problema

Problemas identificados como frequentes nos registros de vacinas



Problemas identificados como frequentes nos registros de vacinas (continuação)



Para os entrevistados, a pandemia:

- Ampliou a circulação de notícias falsas sobre vacinas (+ de 76% no BR, CO e Goiás);
- Diminuiu a procura por vacinas de rotina do PNI nos municípios (64% BR, 71% CO e 70% GO);
- Diminuiu a capacidade operacional de vacinação de rotina do PNI (44% BR, 42% CO e 36% GO);
- Diminuiu a disponibilidade de pessoal para a aplicação de vacinas de rotina do PNI nos municípios (43,5% BR, 41% CO e 37% GO).

Resultados

Surveys Hesitação Vacinal

Entrevistas com adultos, com questões sobre hesitação vacinal e seus motivos, incluindo aspectos relacionados à vacinação de crianças e jovens de 0 a 17 anos, para seus responsáveis.

- **2.235** pessoas acima de 18 anos de idade

Confiança nas vacinas

1. Confiança nas vacinas como forma de proteção individual e coletiva, no SUS e PNI
2. Confiança elevada nos profissionais que prescrevem, informam e aconselham sobre vacinas
3. Confiança em líderes religiosos e informações de postagens em redes sociais na hora de se decidir sobre a própria vacinação (> idosos e pessoas com baixa escolaridade e renda)

Fatores associados à hesitação vacinal em crianças, adolescentes e adultos

1. Preocupação com os efeitos colaterais das vacinas
2. Baixa percepção de risco para doenças que não são mais comuns atualmente
3. Percepção de que as vacinas disponibilizadas pelo setor privado são mais confiáveis
4. Percepção de que as vacinas novas apresentam mais risco que as antigas
5. Percepção de que administrar a vacina contra o HPV para adolescentes pode incentivar a vida sexual precocemente
6. Percepção de que a indústria farmacêutica inventa a necessidade de vacinar para ganhar dinheiro
7. Dificuldades de deslocamento para chegar até os locais de vacinação

Entrevistas com profissionais que realizam ações de imunização, com questões relacionadas à prática cotidiana e experiência de vacinação, percepção de hesitação vacinal e recursos de informação sobre a vacinação em geral.

- **1.005** profissionais de salas de vacina de UBS de todas as regiões do país
- **110** pediatras de consultórios privados

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SALAS DE VACINA DE UBS

Confiança nas vacinas

1. As vacinas são seguras, são eficazes e confiam nas recomendações do PNI
2. Os respondentes se consideram bem preparados, com conhecimentos e habilidade necessários para lidar com situações em que há hesitação por parte dos usuários
3. Se sentem confortáveis para prescrever, recomendar e aplicar as vacinas para os diversos grupos populacionais

Percepção da hesitação vacinal

1. 1/3 dos profissionais percebem relutância ou hesitação por parte dos usuários sobre as vacinas
2. A hesitação é maior do que a recusa completa
3. A hesitação em se vacinar ocorre mais notadamente para vacinas contra a COVID-19, gripe e HPV

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE SALAS DE VACINA DE UBS

Fatores associados à hesitação vacinal na população

1. Preocupação com os efeitos colaterais
2. Medo de agulhas, por acharem que são muito dolorosas
3. Conhecer ou já ter ouvido falar de alguém que teve uma reação adversa
4. Muitas vacinas sendo administradas ao mesmo tempo

PEDIATRAS DE CONSULTÓRIOS PRIVADOS

Confiança nas vacinas

1. A maioria dos pediatras respondentes considera que as vacinas são seguras

Percepção da hesitação vacinal

1. Percepção de que a hesitação em vacinar crianças e adolescentes ocorre com pouca frequência e a recusa é mais rara
2. Houve crescimento da hesitação e da recusa nos últimos anos

Fatores associados à hesitação vacinal na população

1. Preocupação com os efeitos de longo prazo das vacinas
2. Crença de que terapias alternativas são uma escolha melhor do que as vacinas

Resultados

Análise qualitativa com atores
envolvidos nas ações de
imunização

25 entrevistas em profundidade:


- gestores federais cuja prática tivesse interseção com a política nacional de imunização;
- coordenadores estaduais de imunização;
- e especialistas referência no domínio de temas abordados na pesquisa.

17 grupos focais:

- gestores municipais;
- rede de apoiadores COSEMS/CONASEMS;
- trabalhadores de saúde;
- população adulta.

A Pesquisa de Opinião Deliberativa foi conduzida a partir do evento denominado **Diálogos Online (DOL) – Cobertura vacinal, desinformação e hesitação**, realizado em plataforma digital, entre os dias 9/11/21 a 13/12/21, com 2.533 inscritos.

Participação por Perfil -
Diálogo Online (DOL) Cobertura vacinal,
desinformação e hesitação



4 Webinários

- Retrospectiva da cobertura vacinal no Brasil (2010-2020)
- Como o SUS pode se fortalecer para os desafios das ações de imunização nos territórios?
- O que é hesitação vacinal e o quanto ela impacta a cobertura vacinal?
- Informação e desinformação: como as redes sociais podem afetar a cobertura vacinal no Brasil?

4 Conferências

- Políticas de saúde e ações de imunização no âmbito do SUS
- O(s) movimento(s) antivacina(s) no Brasil
- Desafios em Ciência e Tecnologia em Saúde: as lições da pandemia da Covid-19
- Conferência de encerramento: Apresentação dos encaminhamentos construídos nos Diálogos Online

<https://www.youtube.com/channel/UCVF124xR4eR5pkWG6AtLspg>

Queda da cobertura vacinal no Brasil como um problema multifatorial

1. *Hesitação vacinal*

- Percepção de que a população atrasa para receber os imunizantes, mas são raros os casos de recusa
- Atraso amplamente associado à **complacência** (baixa percepção de risco, em função da erradicação de diversas doenças)
- Barreiras de acesso também foram amplamente apontadas como importante causa do atraso do calendário de vacinação (**conveniência**)
- Desinformação e receio dos possíveis efeitos adversos causados pelos imunizantes

2. *Gargalos da força de trabalho*

- Com frequência um único profissional fica responsável por administrar a vacina, registrá-la na caderneta e no sistema, orientar os pacientes e/ou suas famílias, entre outras atribuições (sobrecarga)
- Escassez de mão de obra qualificada e alta rotatividade de profissionais
- Ausência de profissional exclusivo para atividade de registro
- Problemas de RH são mais evidentes nos municípios de pequeno porte

3. *Barreiras de acesso às salas de vacina*

- Horário de funcionamento das salas de vacina (dias úteis e horário comercial), em geral, não atende à dinâmica cotidiana da população e contribui para o atraso da imunização

4. Problemas no Registro

- Mudança nos sistemas de informação do PNI, com dificuldade de compatibilização com sistemas anteriores e/ou próprios (municipais e/ou estaduais), agravada pela resistência dos profissionais envolvidos, bem como a falta de capacitação dos mesmos frente às mudanças
- Acesso precário à internet e/ou a computadores

5. *Qualificação das ações de busca ativa e ausência de políticas intersetoriais*

- Necessidade de incremento das ações de busca ativa e das políticas intersetoriais, em especial com as secretarias de educação

6. *Ausência e fragilidade das campanhas de vacinação*

- Campanhas de vacinação cada vez mais irregulares e perdendo a capacidade efetiva de se comunicar com seus públicos-alvo

Resultados

Monitoramento do debate público contra vacinas em plataformas digitais

- Monitoramento dos conteúdos e vocabulários empregados na discussão contra vacinas no Brasil por meio da análise das plataformas digitais

Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook

- A análise realizada entre 11 de maio e 15 de novembro de 2021
- Contexto da pandemia da Covid-19 influencia o comportamento das pessoas diante da vacinação contra a Covid-19 em redes sociais digitais e plataformas de compartilhamento de conteúdo


Cenário: disseminação de conteúdo contra vacinas segue **gramáticas de desinformação intensificadas nos últimos cinco anos**, no país e no exterior



Algumas **estratégias**:

- i) uso de imagens de fácil reconhecimento;
- ii) estética semelhante à de peças de divulgação científica e de campanhas de conscientização;
- iii) a negação de conteúdo produzido por veículos de informação tradicionais;
- iv) tradução de conteúdo antivacinas produzido no exterior;
- v) autovitimização dos disseminadores de conteúdo falso, quando denunciados;
- vi) A atuação multiplataformas.

- **Levar os hesitantes a sério**, buscando compreender suas razões para hesitação;
- Desenvolver estratégias adequadas e permanentes de **escuta institucional e acompanhamento do debate público** sobre vacinas;
- Não tratar todo conteúdo que pode promover hesitação vacinal como forma de desinformação, criando **táticas distintas para lidar com diferentes formas discursivas** que possam produzir hesitação;
- **Evitar discursos que culpabilizem o indivíduo** pela hesitação;



Reflexões sobre o alcance dos resultados

ICV

- Tendência de queda dos índices de cobertura vacinal também foi observada em Goiás, nas 5 macrorregiões, para todos os imunobiológicos analisados.
- Em 2019, 2020 e 2021 praticamente nenhuma vacina atingiu a meta preconizada (exceções: Centro Norte BCG – 2019; Sudoeste BCG – 2019/202 e Rotavírus 2019; Município de Goiânia BCG 2021).
- Em 2021 a tendência de queda das CV se manteve para a maioria dos imunobiológicos nas macrorregiões Sudeste, Centro Norte, Nordeste e Sudoeste
- Na macrorregião Centro Oeste observou-se uma estabilidade das CV em relação à 2020, com leve aumento da CV em alguns imunobiológicos.

Taxa de abandono 2020

- Cenário positivo: Rotavírus; Pneumocócica; Meningocócica C (vacinas de 2 doses) - (taxas baixas e melhoria em relação à 2015)
- Cenário de atenção: Poliomelite (3 doses) com taxas médias/altas – piora em relação à 2015 - exceto Macro Centro Norte); Tríplice Viral – melhoria em relação à 2015, apesar da taxa ainda ser alta
- Cenário preocupante: Pentavalente (taxas muito altas, com piora em relação à 2015)

Homogeneidade das CV 2020

- **Muito baixa** para todos dos imunobiológicos analisados

Pode levar ao aumento do risco atribuível às doenças imunopreveníveis.

Survey com Secretarias Municipais de Saúde de Goiás

Percebe-se um cenário de **HETEROGENEIDADE** entre as 5 macrorregiões

- Problemas de **recebimento** pouco frequentes (22% a 40%) – Mais comuns na Macro Centro Norte
- Problemas de **armazenamento** pouco frequentes (15% a 37%) - Mais comuns na Macro Nordeste
- Problemas de **aplicação** pouco frequentes (25% a 40%) – Mais comuns nas Macro Sudeste e Centro Oeste (apesar de uma % menor de municípios terem relatado problemas de aplicação em geral, uma maior % apontou problemas específicos nestas regiões).
- Problemas de **registro** muito frequentes (51% a 67%) - comuns nas 5 macrorregiões, com algumas variações em relação à intensidade de cada problema entre as regiões
- Problemas de **atraso/recusa** muito frequentes (77% a 88%) - comuns nas 5 macrorregiões, com algumas diferenças em relação aos motivos mais comuns entre as regiões

1. O sucesso do PNI no Brasil foi historicamente destacado por todos os grupos pesquisados.
2. O país possui cenários distintos na execução do PNI, especialmente na organização do trabalho e infraestrutura (falta de energia, armazenamento de vacinas, rede de frio, recebimento das vacinas, aplicação e registro, centralização das salas, busca ativa, entre outros).
3. População e profissionais de saúde confiam no SUS e nas vacinas. A hesitação e a recusa absoluta foram reportadas com pouca frequência, mas tem sido mais comuns.
4. As atuais estratégias de comunicação adotadas não são efetivas.
5. Gargalos em recursos humanos repercutem nas baixas coberturas. Desafios: capacitação; alta rotatividade.
6. Profissionais relatam que assumir salas de vacina envolve mais estresse e cobrança.

7. Sistemas de informação: municípios utilizam sistemas paralelos que geram questionamento sobre metas e apresentam um cenário de heterogeneidade dos dados.
8. Muitos municípios relatam que as metas de cobertura são inatingíveis/inadequadas devido a previsões demográficas imprecisas, especialmente para municípios pequenos.
9. Os gestores e profissionais precisam priorizar o problema mais relevante no alcance das metas de cobertura vacinal para mobilizar cada região de saúde. Os profissionais devem ter acesso e discutir essas análises críticas.
10. Pouca integração e comunicação entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Básica.
11. Ponto crítico: dados de vacinação oriundos do setor privado (especialmente de pequenos consultórios e clínicas médicas). Buscar apoio da vigilância sanitária, considerando a legislação (RDC 197/2017).

12. Os movimentos antivacina para COVID 19 amplificaram a desinformação para outras vacinas.
13. Crescimento da desinformação teve impacto na hesitação. Forte relação entre hesitação e o perfil socioeconômico no território.
14. Importância da parceria entre a academia e CONASEMS.
15. Expectativa de que os achados contribuam para elaboração de estratégias de enfrentamento às baixas coberturas de modo regionalizado.

Referências bibliográficas

- APS, L. R. de M. M.; PIANTOLA, M. A. F.; PEREIRA, S. A.; CASTRO, J. T. de; SANTOS, F. A. de O.; FERREIRA, L. C. de S. Adverse events of vaccines and the consequences of non-vaccination: a critical review. *Revista de Saúde Pública*, [S. l.], v. 52, p. 40, 2018. DOI: 10.11606/S1518-8787.2018052000384. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/145028>.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de Imunizações (Brasil). Coberturas Vacinais no Brasil – Período 2010-2014. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015a. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/agosto/17/AACOBERTURAS-VACINAIS-NO-BRASIL---2010-2014.pdf>. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2015b. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_resposta_emergencias_saude_publica.pdf.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Avaliação das coberturas vacinais - Calendário Nacional de Vacinação, jun. 2018. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/29/3.a-Avaliacao-coberturas-vacinais-2018.pdf>. COUTO, M. T.; BARBIERI, C. L. A.; MATOS, C. C. de S. A. Considerações sobre o impacto da COVID-19 na relação indivíduo-sociedade: da hesitação vacinal ao clamor por uma vacina. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1196/version/1282>>. Acesso em: 3 mar. 2021.
- DONIEC, K.; DALL'ALBA, R.; KING, L. Brazil's health catastrophe in the making. *The Lancet*, v. 392, n. 10149, p. 731–732, set. 2018. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)30853-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30853-5/fulltext).
- RASELLA, D. et al. Child morbidity and mortality associated with alternative policy responses to the economic crisis in Brazil: A nationwide microsimulation study. *PLOS Medicine*, v. 15, n. 5, p. e1002570, 22 may 2018. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002570>.
- SATO, A. P. S. What is the importance of vaccine hesitancy in the drop of vaccination coverage in Brazil? *Revista de Saúde Pública*, v. 52, p. 96, 22 nov. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102018000100601.
- SILVA, B. S. et al. Structural and procedural conditions in National Immunization Program Information System establishment. *Rev. Bras. Enferm.*, Brasília, v. 73, n. 4, e20180939, 2020. Disponível em: <http://reben.com.br/revista/artigos/?volume=73&ano=2020&numero=4&item=162>.

Obrigada!

comunicacao@nescon.medicina.ufmg.br

assessoria@conasems.org.br